

Figura/foto cane  
Logo e croce Bayer  
Per uso veterinario

## FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

### DRONTAL, compresse per gatti

**1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Bayer S.p.A.  
Viale Certosa, 130  
20156 Milano

Fabbricante e responsabile del rilascio dei lotti

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324,  
24106 Kiel  
Germania

**2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

DRONTAL®, compresse per gatti  
Praziquantel  
Pirantelmonato

**3. INDICAZIONE DELLA SOSTANZA(E) ATTIVA(E) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

1 compressa contiene:

Principi attivi:	
Praziquantel	20 mg
Pirantelmonato	230 mg

**4. INDICAZIONE(I)**

Per il trattamento delle infestazioni miste del gatto da nematodi e cestodi, provocate da:

Ascaridi: Toxocara cati (sin. mystax), Toxascaris leonina.

Anchilostomi: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense.

Cestodi: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp., Joyeuxiella spp..

## **5. CONTROINDICAZIONI**

Non usare in animali con ipersensibilità accertata ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti

Drontal non deve essere impiegato durante la gravidanza.

Non usare in gattini al di sotto delle 4 settimane di età.

Non usare contemporaneamente a composti a base di piperazina.

## **6. REAZIONI AVVERSE**

Nessuna conosciuta.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

## **7. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Per gatti.

## **8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

### Posologia

La dose è di 5 mg di praziquantel e 57,5 mg di pirantel embonato per kg di peso corporeo.

Questo corrisponde a 1 compressa ogni 4 kg di peso corporeo.

La compressa può essere frazionata secondo necessità

### Modo di somministrazione

Da somministrare nei gatti per via orale.

La somministrazione delle compresse avviene direttamente oppure avvolgendole in un pezzo di carne o salsiccia oppure con il mangime sminuzzandole.

Non sono necessari provvedimenti dietetici.

L'impiego avviene in un'unica soluzione.

## **9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Non impiegare dopo la data di scadenza.

Da non impiegare negli animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.

## **10. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta

## **11. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)**

### **Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Al fine di ottenere un efficace controllo dei parassiti il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico.

### **Speciali precauzioni per l'impiego negli animali**

Per assicurare un dosaggio corretto, gli animali dovrebbero essere pesati.

Poiché l'infestazione da cestodi nel gatto non compare prima della 3<sup>a</sup> settimana di vita il trattamento con Drontal è indicato solo dopo la 3<sup>a</sup> settimana di vita.

La resistenza di parassiti ad una particolare classe di antelmintici potrebbe svilupparsi a seguito dell'uso frequente, ripetuto di un antelmintico della stessa classe.

L'echinococcosi rappresenta un pericolo per l'uomo, In caso di echinococcosi devono essere seguite specifiche linee guida per il trattamento e il follow up e per la salvaguardia delle persone. Consultare un esperto o un istituto di parassitologia.

Non utilizzare in animali gravemente debilitati o con grave compromissione della funzionalità epatica o renale.

### **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Le persone con nota ipersensibilità ai principi attivi contenuti in questo medicinale devono somministrare il prodotto con cautela.

Lavare le mani dopo l'uso. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di irritazione oculare, rivolgersi ad un medico. Non mangiare, bere o fumare mentre si utilizza il prodotto.

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

### **Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Nessuna conosciuta

### **Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione**

Drontal non deve essere impiegato durante la gravidanza

### **Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario**

Sintomi di sovradosaggio non si evidenziano con dosi fino a 5 volte la dose raccomandata. Il primo sintomo atteso di intossicazione è il vomito.

## **12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti

## **13. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Maggio 2011

## **14. ALTRE INFORMAZIONI**

### Confezioni:

Scatola da 2 compresse

Scatola da 6 compresse

Scatola da 8 compresse

Scatola da 24 compresse

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.