

Figura/foto cane
Logo e croce Bayer
Per uso veterinario

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Drontal cucciolo sospensione orale,
per cani: cuccioli e cani giovani

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

BAYER S.p.A.
Viale Certosa, 130
20156 Milano

Fabbricante e responsabile del rilascio dei lotti

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel
Germania

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Drontal cucciolo sospensione orale

3. INDICAZIONE DEI (L) PRINCIPI (O) ATTIVI (O) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

1 ml di sospensione contiene:

Principi attivi:

Febantel	15,0 mg
Pirantel Embonato	14,4 mg

Conservanti:

Sodio propionato	2,05 mg
Sodio benzoato	2,05 mg

Altri eccipienti q.b. ad 1 ml

4. INDICAZIONE(I)

Antielmintico per l'impiego nei cuccioli e nei cani giovani.

Per il trattamento delle infestazioni provocate dai seguenti nematelminti:

ascaridi	- Toxocara canis
	- Toxascaris leonina
anchilostomi	- Uncinaria stenocephala
	- Ancylostoma caninum
tricocefali	- Trichuris vulpis

A causa della precoce comparsa di infestazioni da ascaridi (infestazione intrauterina e galattogena) il trattamento con Drontal cucciolo dovrebbe iniziare già all'età di ca. 2 settimane. È consigliabile ripetere il trattamento a intervalli di 14 giorni.

5. CONTROINDICAZIONI

Nessuna conosciuta.

6. REAZIONI AVVERSE

Possono manifestarsi rari casi di disturbi gastrointestinali (vomito, anoressia, diarrea)

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglio illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cuccioli e cani giovani

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Da somministrare per via orale nei cuccioli e nei cani giovani.

La dose è di 15 mg di Febantel e 14,4 mg di Pirantelmonato per kg di peso corporeo. Questo corrisponde a 1 ml di sospensione per 1 kg di peso corporeo.

La sospensione può essere somministrata direttamente con il dosatore a siringa accluso oppure indirettamente mescolandola con il cibo. Non sono necessarie misure dietetiche.

L'applicazione è singola per ogni sverminazione.

Nel caso di infestazione da ascaridi in particolare nei cuccioli, non ci si deve attendere un'eliminazione completa, quindi può persistere il rischio d'infestazione per l'uomo. Per questo motivo sono consigliati trattamenti ripetuti nei cuccioli a intervalli di 14 giorni.

Agitare prima dell'uso.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

-

10. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 12 settimane

11. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico sulle feci. Può svilupparsi resistenza dei parassiti a qualsiasi particolare classe di antelmintici dopo un uso frequente e ripetuto di un antelmintico di quella classe.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, non miscelare con altri medicinali veterinari.

Sovradosaggio (sintomi, provvedimenti di emergenza, antidoti) se necessario

Un sovradosaggio di 5 volte con DRONTAL CUCCIOLO è stato tollerato dai cuccioli e dai cani giovani senza sintomi.

Per un sovradosaggio di 10 volte ci si deve attendere come unico sintomo il vomito.

Non utilizzare negli animali destinati alla produzione di alimenti.

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Il prodotto medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti da esso derivati, devono essere conferiti negli abituali punti di raccolta per i farmaci scaduti o inutilizzati.

13. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

12/2016

14. ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni:

Flacone da 50 ml e dosatore a siringa da 5 ml

Flacone da 100 ml e dosatore a siringa da 5 ml

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.